

# Les plantes et les fourmis

Alain Lenoir

Professeur émérite, IRBI, Université François Rabelais TOURS

Ce texte est basé sur une conférence à Touraine Inter-âges le 9 décembre 2010. Les références ont été rajoutées ensuite.

*Mise à jour le 16 juin 2011*

L'année 2010 a été consacrée Année de la Biodiversité. Tout le monde a entendu les problèmes de la perte irréparable de biodiversité de notre planète. On s'occupe beaucoup des plantes et des vertébrés, par exemple tout récemment le tigre (Vincent, 2010). Pourtant la véritable biodiversité est sans doute à chercher du côté des forêts tropicales et du côté des organismes inférieurs comme les invertébrés ou encore les bactéries. En réalité, les écosystèmes sont des ensembles où toutes les espèces sont en interaction dynamique. On va voir quelques exemples montrant que les plantes sont souvent associées avec des fourmis, depuis des associations facultatives (consommation, habitat) jusqu'aux associations obligatoires que l'on appelle symbiotiques.

Mutualisme : Relation qui apporte des bénéfices aux deux partenaires

Symbiose : Relation mutualiste permanente entre deux organismes

Myrmécophytes : plantes supérieures qui entretiennent une relation mutualiste obligatoire avec des fourmis

## 1) Associations facultatives

### Nids dans les plantes

De nombreux arbres et arbustes et même des petites plantes sont utilisés par les fourmis pour nidifier : trous dans le tronc, galles, épines, branches creuses. En régions tropicales des espèces opportunistes construisent de grands nids en carton sur les arbres. Elles élèvent des homoptères producteurs de sève (voir plus loin).

Il s'agit d'associations non spécifiques : une espèce de fourmis peut s'installer sur n'importe quel végétal si les conditions sont favorables.

On connaît des espèces avec individus « portiers » à tête élargie pour boucher l'entrée du nid (*Colobopsis truncatus* dans nos régions).

*Lasius fuliginosus* forme un nid en carton (fibres végétales mâchées comme les guêpes) dans une cavité d'arbre.

Les fourmis charpentières vivent dans des galeries du bois mort qu'elles agrandissent. Chez nous il y a *Camponotus vagus* qui ne fait pas de dégâts. Ce n'est pas le cas d'autres fourmis charpentières en Amérique du Nord qui peuvent attaquer des charpentes.

### Élevage de pucerons, cochenilles et autres homoptères.

Les fourmis sont très attirées par le sucre. Une source de sucre (et d'acides aminés) est le miellat des pucerons. Ceux-ci piquent l'écorce des végétaux et pompent la sève. Ils en absorbent beaucoup trop et rejettent l'excédent (90%) par l'anus ; c'est le miellat. Les pucerons sont protégés par les fourmis contre les prédateurs comme les coccinelles et certains parasites. Par exemple, un travail récent a montré que le taux de super-parasitisme (parasites de parasites) diminue considérablement en présence des fourmis *Lasius niger* (Sanders and van Veen, 2010). Les pucerons peuvent être déplacés en hiver ou lors des migrations. Il s'agit donc d'un véritable élevage.

On considère souvent les fourmis comme néfastes car la plante est affaiblie par les pucerons trop nombreux. Mais le bilan est plutôt considéré positif actuellement car il y a prédation de nombreux insectes. En fait, le système est complexe : si on place des filets sur les rosiers pour empêcher le développement du puceron du rosier on diminue le nombre de fourmis.

Les fourmis rousses dans nos forêts qui forment les grands dômes d'aiguilles et branchettes élèvent de nombreux pucerons mais détruisent de nombreux insectes phytophages. Ces fourmis rousses sont protégées en Suisse. On les a transplantées en Italie dans les années 1960, mais avec un succès mitigé. Il y a actuellement un problème, leur population diminue très fortement, par exemple en Touraine sans que l'on sache pourquoi.

#### Récolte et dispersion des graines

Tout le monde connaît les fourmis moissonneuses qui font de longues pistes ramenant au nid des graines en région méditerranéenne.

Ces fourmis moissonneuses habitent en région semi-aride : *Messor* chez nous (ne piquent pas), *Pogonomyrmex* en Amérique (piqûre douloureuse). Un cercle autour du nid marque la limite où sont rejetées les graines non consommées.

Dans nos régions, en forêt, certaines graines ont un élaïosome (partie pulpeuse riche en graisses attractives pour les fourmis) ; elles sont rapportées au nid (violette, cyclamen, mélampyre, chélidoine). L'élaïosome est consommé, puis la graine est rejetée, ce qui contribue à sa dissémination. On parle de myrmécochorie : mode de dispersion des graines par les fourmis. Il existe de nombreuses espèces de graines avec élaïosome, de couleurs et formes très variées. En Afrique du Sud certaines espèces de plantes endémiques à élaïosome sont dispersées par des fourmis locales. La fourmi d'Argentine invasive détruit ces fourmis, mais elle ne récolte pas ces graines donc les plantes sont menacées de disparition.

#### Rôle des fourmis dans la pollinisation ?

Très faible, pourtant les fourmis peuvent se nourrir du nectar des fleurs.

Fourmis fileuses tropicales *Oecophylla*. Le nid est formé de feuilles « cousues » avec la soie des larves. Il est composé de nombreux petits nids (+ 150) sur les arbres qui sont très défendus, il y a une seule reine. Ces fourmis sont utilisées en Chine et au Vietnam pour protéger les cultures de citronniers.

Autre fourmi fileuse : *Polyrhachis* qui fait des nids avec de la soie des larves et des morceaux végétaux ou même de la terre. Une espèce utilisée dans la pharmacopée chinoise, élevée dans ce pays à grande échelle (des milliers de fermes).

Jardins de fourmis sur les arbres en Amazonie : boule de terre sur laquelle poussent de nombreuses plantes comme des Broméliacées et où vivent souvent plusieurs espèces de fourmis. Ces plantes possèdent des nectaires et des corps nourriciers extrafloraux qui attirent les fourmis, et produisent un nectar riche en sucres, acides aminés et nombreuses autres substances. Cela produit un véritable écosystème avec des creux où de l'eau s'accumule et toute une faune aquatique s'y installe. La plante récupère de l'azote provenant des cadavres d'insectes.

#### Fourmis consommatrices de plantes

Certaines fourmis consomment des pétales de fleurs comme les cystes. Une espèce endémique d'Andalousie est même spécialisée et a pour cette raison été appelée *Cataglyphis floricola*.

#### Champignons ennemis des fourmis

Diverses espèces de champignons se développent dans le corps de la fourmi, bien que celle-ci se lèche régulièrement. L'ouvrière malade sort alors du nid pour mourir (ex champignons Laboulbéniales). Le champignon peut véritablement prendre possession du cerveau de la fourmi qui se laisse tomber de la canopée et reste accrochée sur une feuille par ses mandibules où elle va pour mourir. Cela favorise la dispersion des spores du champignon. On qualifie cette fourmi de « zombie ». C'est le cas avec un champignon du genre *Cordiceps* (Anonyme, 2011; Hughes et al., 2011)

## 2) Associations obligatoires (= symbioses) entre plantes et fourmis

### Arbres à fourmis (myrmecophytes).

Il s'agit d'une véritable symbiose : hébergement des fourmis dans des cavités foliaires ou caulinaires (appelées domaties) et nutrition à partir de corpuscules (corps nourriciers riches en protéines) ou de sécrétions (nectar extrafloral riche en sucres fructose, glucose et saccharose avec des acides aminés libres), parfois les deux. Dans l'autre sens les fourmis protègent la plante contre les défoliateurs. La fourmi apporte aussi des déchets azotés (cadavres) qui manquent à la plante (comme les plantes carnivores). Pour cette raison, ces plantes importées et élevées en serre sans leurs fourmis poussent mal. Sur ces arbres, les fourmis élèvent aussi souvent des pucerons et autres hémiptères pour leur miellat (voir plus haut). Les fourmis défendent leur plante hôte contre les autres plantes comme les nombreuses lianes en forêt tropicale : elles patrouillent à la base de l'arbuste et coupent les jeunes pousses. Elles nettoient les feuilles pour éliminer les pathogènes (champignons), mangent les œufs des insectes herbivores et repoussent les mammifères. Très nombreux cas sont connus : plus de 100 genres d'Angiospermes et 40 genres de fourmis. Dans nos régions cela n'existe pas.

### Jardins du diable

En Amazonie on connaît des surfaces où vit une seule espèce d'arbuste (*Duroia hirsuta*) avec sa fourmi (*Myrmelachista schumanni*) qui détruit les plantules des autres plantes avec l'acide formique. La fourmi mord la plantule et y dépose une goutte d'acide. Ces jardins sont très stables, on en connaît qui ont 800 ans et 350 arbustes. Il y a une seule colonie avec trois millions d'ouvrières et 15 000 reines (Frederickson et al., 2005).

### Arbre à la femme adultère

Les arbres *Barteria* en forêt tropicale hébergent (*Tetraoponera*) une fourmi à piqûre très douloureuse. Les femmes adultères étaient autrefois attachées sur cet arbre au Cameroun.

Les arbres acacias sont myrmécophytes. Ils hébergent des *Crematogaster* (Afrique) ou des *Pseudomyrmex* (Amérique) qui les protègent contre les défoliateurs, par exemple girafes et éléphants en Afrique. Des études ont été conduites au Kenya où le nombre d'éléphants a cru de 5 fois depuis 1992 : quand les fourmis sont expulsées avec de la fumée, les acacias sont mangés par les éléphants et un peu les girafes. La symbiose fourmis - plantes est donc un élément important dans le maintien de la savane (Anonyme, 2010; Goheen and Palmer, 2010).

*Cecropia* et *Azteca* en Amérique : invention du velcro. En Guyane, la symbiose entre les fourmis du genre *Azteca* et l'arbre *Cecropia* (ou bois canon) est fréquente. La fourmi utilise le principe du Velcro pour s'agripper fermement aux feuilles du *Cecropia* et pouvoir ainsi capturer de très grosses proies. Les fourmis de cette espèce ne se nourrissent pas à partir de corps nourriciers fournis par l'arbre en plus du logement, mais ont mis au point une stratégie de chasse reposant sur une organisation sociale très élaborée. Les ouvrières se postent côte à côte sous la bordure des feuilles de l'arbre et attendent dans cette position

d'éventuelles proies qui viendraient se poser pour trouver un abri ou attaquer les feuilles de l'arbre. Dans cette position, les fourmis s'agrippent solidement aux feuilles grâce au principe du Velcro. En effet, la face inférieure des feuilles présente une ramification de longs poils qui constitue la partie «velours» sur laquelle s'accrochent les griffes des ouvrières formant la partie «crochets». Grâce à ce principe, une fourmi peut maintenir jusqu'à plus de 5 000 fois son poids. Un groupe d'ouvrières peut capturer de très grosses proies, la plus grosse rencontrée étant un criquet de 18,61 g soit 13 350 fois le poids d'une ouvrière (Dejean et al., 2010).

#### Pièges à insectes (Guyane)

*Allomerus decemarticulatus* associée spécifiquement à une plante à fourmis *Hirtella physophora*. Elles vivent dans des poches des tiges, creusent des galeries dans les pétioles et percent de très nombreux trous où elles peuvent entrer et sortir. Elles renforcent le système avec le mycélium d'un champignon. Cela fonctionne comme un piège ; les fourmis guettant avec la tête juste dans le trou et s'agrippant à la proie qui se pose, pour la piquer (Dejean et al., 2005).



#### Fourmis champignonnistes (fourmis parasol en Guadeloupe)

Les coupeuses de feuilles d'Amérique tropicale font partie de la sous-famille des Attines avec 230 espèces. Elles ont inventé il y a 50-60 millions d'années la culture des champignons sur compost élaboré à partir de feuilles mâchées.

*Atta* et *Acromyrmex* cultivent un champignon de type agaric avec des morceaux de feuilles, les larves sont nourries avec les mycotêtes (= gondyliodia ou choux-raves) du champignon (surtout hémicellulose, la cellulose est peu digérée), les adultes se nourrissent simplement avec la sève des feuilles. Le champignon ne fructifie presque jamais, sauf si la colonie meurt. Les nids comportent une seule reine inséminée jusqu'à 10 fois. Elle peut vivre jusqu'à 15 ans, elle pond en moyenne 20 œufs par minute, 10 millions par an.

Les vols nuptiaux sont spectaculaires, regroupant des milliers de sexués (fourmis volantes). La reine fécondée souvent par plusieurs mâles va avoir une réserve de sperme pour toute sa vie. Elle emporte dans son vol nuptial un fragment de mycélium pour fonder une nouvelle colonie et démarrer sa culture.

Le succès considérable de ces fourmis est lié à la taille des colonies : plusieurs millions d'individus. Ceux-ci sont de taille très variable (castes), et ont des tâches bien différenciées. Celles que l'on voit sont les fourrageuses qui vont récolter les feuilles. Elles s'organisent en brigades et travaillent à la chaîne. Elles sont protégées par des soldats aux mandibules acérées.

La fourmi et le champignon forment une véritable symbiose. Les ouvrières reconnaissent leur propre souche de champignon et tout champignon étranger est rejeté. Ces dernières années on a découvert que la symbiose est bien plus complexe que ce que l'on pensait. Des champignons parasites très virulents peuvent se développer dans la culture et tuer la colonie rapidement. La réponse des fourmis a été de domestiquer des bactéries qui se trouvent sur le corps de la fourmi et secrètent des antibiotiques. Ces bactéries sont aussi emportées par la jeune reine fondatrice. Le système est encore bien plus complexe avec des levures qui mangent les bonnes bactéries ; et d'autres micro-organismes en cours de découverte. On vient par exemple de trouver des bactéries fixatrices d'azote comme celles qu'on trouve dans les racines de légumineuses. Il existe un véritable « microbiome » bactérien dans la meule à champignon où ce sont des bactéries qui digèrent les parois cellulaires des plantes (Suen et al., 2010).

Le nid souterrain est de la taille d'une maison. C'est une vraie mégapole, il faut excaver 60 tonnes pour un nid complet âgé de seulement 6 ans. Il se prolonge par de nombreux tunnels à 40-50 cm sous la surface du sol, qui peuvent aller jusqu'à 90 mètres et facilitent l'approche des arbres ou arbustes. Il peut s'étendre sur un hectare.

Ce texte est inspiré du livre sur les fourmis coupeuses de feuilles de (Hölldober and Wilson, 2010).

### L'agriculture chez les animaux

L'agriculture n'est pas l'exclusivité des fourmis, on a vu que certains termites aussi cultivent des champignons. On connaît d'autres rares exemples comme les coléoptères scolytes qui creusent un trou dans l'arbre à coloniser et cultivent un champignon du genre *Ambrosia* dans les galeries. Les adultes et les larves se nourrissent du mycélium (Farrellab et al., 2001). Très récemment, on vient de découvrir que les amibes sociales *Dictyostelium discoideum* pratiquent une forme primitive d'agriculture. Ces amibes se nourrissent de bactéries et quand la nourriture vient à manquer ou le milieu devient hostile, elles forment une fructification de spores agrégées. Certaines souches vont économiser les bactéries qu'elles consomment et vont les stocker dans leurs fructifications en vue de dispersion pour le cas où le milieu ne contiendrait pas assez de ces bactéries. Cependant, seules 30% des amibes vont faire ces réserves ; on ne sait pas pourquoi (Farrellab *et al*, 2001; Boomsma, 2011; Brillaud, 2011; Brock et al., 2011).

### Bactéries et fourmis

On a vu que les champignonnistes sont associées à des bactéries. De nombreuses fourmis ont des bactéries symbiotes comme les *Camponotus*. Celles-ci les aide à assimiler des acides aminés, mais aussi facilitent leur défense immunitaire (de Souza et al., 2009).

### Discussion

#### Les fourmis sont-elles nuisibles ?

Il n'y a pas de réponse simple. La fourmi de feu est considérée comme très nuisible, en particulier à cause des piqûres qu'elle inflige, mais dans certaines conditions elle peut être utile. On a ainsi montré que sur les plans de coton en serre que si les aphides sont plus nombreux, ils sont mieux protégés par la fourmi de feu qui exerce une plus forte prédation sur les chenilles défoliatrices. Le bénéfice peut être de 10% en production de coton (Styrsky and Eubanks, 2010). Les attines font partie des écosystèmes tropicaux et ne détruisent pas la forêt autour de leur nid, mais en monoculture, elles deviennent très nocives. On a introduit au Gabon une petite fourmi, *Wasmannia auropunctata* (petite fourmi de feu car elle a une piqure très douloureuse) pour protéger les cacaoyers. Mais par malchance c'est une espèce invasive qui se répand partout dans le monde tropical...

Il faut considérer les écosystèmes en fonctionnement dynamique où la biodiversité est fondamentale. On a vu que la biodiversité favorise le maintien des «écosystèmes comme la savane africaine. D'une manière générale, elle favorise l'adaptation aux changements et décroît l'émergence et la transmission de pathogènes comme cela a été montré sur la tique responsable de la maladie de Lime (Keesing et al., 2010; Le Hir, 2010).

### Notion de coévolution

C'est une notion très importante. La coévolution désigne les transformations qui se produisent au cours de l'évolution de deux espèces vivantes suite à leurs influences réciproques. Les plantes qui étaient protégées par des fourmis étaient avantagées et ont été sélectionnées. De même, les fourmis qui ont su s'adapter à la vie sur ces plantes ont été sélectionnées au cours de l'évolution.

## Communication entre plantes et fourmis ?

On sait depuis peu que les plantes peuvent communiquer entre elles, par exemple émettre un signal d'alarme volatil à destination des plantes voisines quand elles sont attaquées par un herbivore (un insecte le plus souvent). Quand la plante est attaquée, cela provoque des vibrations qui font sortir les fourmis mais les feuilles endommagées émettent des substances volatiles que les fourmis perçoivent et elles ont un effet attractif. Il s'agit selon les espèces de terpènes, aldéhydes, alcools, cétones. Dans un cas, on a trouvé aussi du méthyl-salicylate (= essence de Wintergreen, odeur de pomme sûre, très utilisée en parfumerie et arômes alimentaires) (Blatrix and Mayer, 2010).

## Références

On pourra consulter des ouvrages en français (Passera, 2006; Passera, 2008), Voyage chez les fourmis (Hölldober and Wilson, 1996) et la « bible » des myrmécologues (Passera and Aron, 2005). Pour le côté plantes il existe un excellent ouvrage qui présente la plupart des cas connus (Jolivet, 1986).

- Anonyme (2010). Quand les fourmis défendent les acacias contre les éléphants. Le Monde, 4 septembre.
- Anonyme (2011). Des fourmis contrôlées par un champignon. Le Monde, 28 mai.
- Blatrix, R., Mayer, V. (2010). Communication in ant-plant symbioses, in: Plant communication from an ecological perspective. Baluska, F. and Ninkovic, V. (eds), Berlin, Springer, 127-158.
- Boomsma, J. J. (2011) Evolutionary biology: Farming writ small. Nature 469(7330), 308-309.
- Brillaud, R. (2011) Des organismes primitifs pratiquent l'agriculture ! Science et Vie, 13.
- Brock, D. A., Douglas, T. E., Queller, D. C., Strassmann, J. E. (2011) Primitive agriculture in a social amoeba. Nature 469(7330), 393-396.
- de Souza, D., Bézier, A., Depoix, D., Drezen, J.-M., Lenoir, A. (2009) *Blochmannia* endosymbionts improve colony growth and immune defence in the ant *Camponotus fellah*. BMC Microbiology 9(1), 29.
- Dejean, A., Leroy, C., Corbara, B., Roux, O., Céréghino, R., Orivel, J., Boulay, R. (2010) Arboreal ants use the "velcro principle" to capture very large prey. PLoS One 5, e11331.
- Dejean, A., Solano, P. J., Ayroles, J., Corbara, B., Orivel, J. (2005) Arboreal ants build a trap to ambush and capture prey. Nature 434, 793.
- Farrellab, B. D., Sequeiraa, A. S., O'Mearaa, B. C., Normarkc, B. B., Chungd, J. H., Jordale, B. H. (2001) The evolution of agriculture in beetles (Curculionidas: Scolytinae nad Platypodinae). Evolution 55, 2011-2027.
- Frederickson, M. E., Greene, M. J., Gordon, D. M. (2005) 'Devil's gardens' bedevilled by ants. Nature 437, 495-496.
- Goheen, J. R., Palmer, T. M. (2010) Defensive plant-ants stabilize megaherbivore-driven landscape change in an African savanna. Current Biology 20, 1-5.
- Hölldober, B., Wilson, E. O. (1996) Voyage chez les fourmis, Le Seuil.
- Hölldober, B., Wilson, E. O. (2010) The leaf-cutting ants. Civilization by instinct, Norton.
- Hughes, D., Andersen, S., Hywel-Jones, N., Himaman, W., Billen, J., Boomsma, J. (2011) Behavioral mechanisms and morphological symptoms of zombie ants dying from fungal infection. BMC Ecology 11(1), 13.
- Jolivet, P. (1986) Les fourmis et les plantes, Boubée.

- Keesing, F., Belden, L. K., Daszak, P., Dobson, A., Harvell, C. D., Holt, R. D., Hudson, P., Jolles, A., Jones, K. E., Mitchell, C. E. et al (2010) Impacts of biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases. *468(7324)*, 647-652.
- Le Hir, P. (2010). Moins d'espèces, plus de maladies infectieuses. *Le Monde*, 15 décembre.
- Passera, L. (2006) *La véritable histoire des fourmis*. Paris, Fayard.
- Passera, L. (2008) *Le monde extraordinaire des fourmis*. Paris, Fayard.
- Passera, L., Aron, S. (2005) *Les fourmis. Comportement, organisation sociale et évolution*. Ottawa, Presses scientifiques du CNRC.
- Sanders, D., van Veen, F. J. F. (2010) The impact of an ant-aphid mutualism on the functional composition of the secondary parasitoid community. *Ecological Entomology* 35(6), 704-710.
- Styrsky, J. D., Eubanks, M. D. (2010) A facultative mutualism between aphids and an invasive ant increases plant reproduction. *Ecological Entomology* 35(2), 190-199.
- Suen, G., Scott, J. J., Aylward, F. O., Adams, S. M., Tringe, S. G., Pinto-Tomás, A. n., A. Foster, C. E., Pauly, M., Weimer, P. J., Barry, K. W. et al (2010) An Insect Herbivore Microbiome with High Plant Biomass-Degrading Capacity. *PLoS Genet* 6(9), e1001129.
- Vincent, C. (2010). Un sommet pour sauver le tigre de la disparition. *Le Monde*, 21-22 novembre.